

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十二 明 周王朱橚 撰

積聚門

積聚心腹痛 附論

夫積者陰之氣五臟所生其痛不離其部故上下有所窮也聚者陽之氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無常處此皆由寒氣搏于臟腑與陰陽之氣相擊下上故心腹痛也

診其寸口之脉沉而橫脇下有積腹中有橫積聚痛又寸口脉細沉滑者有積在脇下左右皆滿與背相引痛又云寸口脉緊而牢者脇下腹中有橫積結痛而泄利脉微細者生浮者死

方

旋覆花湯

出聖濟總錄

治冷積不去氣澁腹痛飲食不下

旋覆花

微炒三分

當歸

切焙

黃連

去鬚

桑根白皮

陳麴

牛膝

切焙

芎藭

射干

龍骨

白朮

各一兩半

枳殼

去瓤炒

桂

去粗皮

地榆

各一兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒二十枚

附子

炮裂去皮臍

赤石脂

厚朴

去粗皮生薑汁炒各二兩

黃芩

去黑心半兩

黑豆

合

草

豈薹

去皮兩枚

桃仁

去皮尖雙仁炒二十一枚

右為細剉每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

訶梨勒丸

出聖惠方

治積聚心腹相引疼痛胸膈氣滯不能

飲食

訶梨勒皮

一兩

川大黃

二兩剉碎微炒

烏頭

一兩

當歸

一兩劉
微炒

木香一

兩

白朮一

兩

桂心一

兩

吳茱萸

半兩湯浸七
通焙乾微炒

檳榔一

兩

蓬莪朮一

兩

青橘皮一

兩

湯浸去
皮白焙

神麴

一兩微
炒令黃

右搗細末後將礪砂三兩用醋二升煎半去滓入前

藥末四兩內礪砂醋中攪和勻於銀鍋內煎成膏

和餘藥末搗三二百杵丸梧桐子大每於食前以

生薑橘皮湯下二十九

檳榔散

出聖
惠方

治積聚心腹內疼痛

檳榔一兩

赤芍藥半兩

枳殼半兩
黃去瓢炒

芳窮半兩

赤茯苓

半兩

紫胡

一兩
去苗

木香

半兩

川大黃

一兩

微炒

當歸

三分
剉碎微炒

甘草

三分
炙微赤炒

桃仁

半兩
去皮尖炒

右為粗散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘

時候稍熱服

桂心散

出聖惠方

治積聚心腹疼痛面無潤澤日漸黃瘦

桂心

一兩

川大黃

一兩
剉碎微炒

桔梗

一兩
去蘆

木香

一兩

附子

一兩
炮裂去皮臍

白朮

一兩

高良薑

半兩

芳窮

半兩

當歸

一兩剉
微炒

枳榔

半兩

赤芍

一兩

枳實

半兩

右為細散每於食前溫酒調下五錢生薑湯調下亦

得

青橘皮丸

出聖惠方

治積聚心腹疼痛全不飲食

青橘皮

二兩湯浸
去白瓤焙

當歸

一兩
微炒

枳殼

一兩
麩炒黃

乾漆

一兩搗碎
炒令烟出

附子

一兩炮裂
去皮臍

木香

一兩

白

朮

二兩

桃仁

一兩湯浸去皮
尖雙仁麩炒黃

桂心

一兩

川椒

二分

去目及開口
青微炒出汗

川大黃

二兩剉
碎微炒

厚朴

二兩生薑
汁炙令香

右為細末煉蜜和搗三二百杵如桐子大每服於食

前以溫酒下三十丸

丁香爛飯丸

出瑞竹堂

治食傷太陰又治卒心胃痛消食快

氣

丁香

錢一

丁香皮

錢二

甘草

錢三

甘松

錢三
去土

砂仁

錢三

益智

錢三

荊三棱

錢一
炮

香附子

半兩

木香

錢一

廣茂

錢一
炮

右為細末湯浸蒸餅和丸如菰豆大每服三十丸白

湯送下或細嚼亦可不拘時候或丸如桐子大亦

可

通命丸

療心腹積聚寒中疔痛又心迫滿脇下急

繞臍痛

大黃

遠志

黃耆

麻黃

甘遂

鹿茸

灸各四分

杏仁

六十枚去皮尖兩人者熬

香豆豉

一合熬

芒硝

三分

巴豆

五十粒去皮心皮熬

右搗篩和以蜜丸如小豆先食三丸日再忌蘆笋野

猪肉

木香散

出聖惠方

治積聚心腹疼痛胸膈氣滯四肢無力不

思飲食

木香

三分

訶黎勒皮

檳榔

青橘皮

各半兩湯

浸去白
麩焙

白朮

一分

赤苓

一分

人參

一分

桂心

一分

厚朴

半兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為細散每於食前以溫酒調下二錢生薑棗湯調

下亦得

大黃丸

出聖惠方

治積聚氣心腹妨悶疼痛

川大黃

一兩剉碎微炒

當歸

三分微炒

川芎

三分

訶黎勒

皮

檳榔

各一兩

川烏頭

一兩炮裂去皮臍

乾薑

三分

炮裂剉

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩

炒微黃

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸如桐子大

不計時候溫酒下三十丸

氣痞丸

療寒氣痞積聚結不通繞臍切痛腹中脹

滿胸逼如截憂恚所積用力不節筋脉傷羸瘦不能
食飲此藥食之人強嗜食益氣壯力

烏頭

炮

甘草

炙

葶藶

熱

芫花

芍藥

柑皮

炙各
二分

右搗篩蜜和丸如梧桐子大一服三丸日再不知漸
加至五丸七丸一方桂二分去柑皮忌海藻菰菜
猪肉冷水等一方有通草無柑皮

烏頭丸

療久寒積聚心腹繞臍切痛飲食不下

烏頭炮

甘草炙各三分

茱萸半兩

細辛

半夏

洗三
十通

附子炮

藁本各三兩

右下篩蜜和丸如桐子大先食前服五丸日再不知

稍增之忌羊猪肉冷水薑菜海藻菰菜錫

化鐵丹

出御藥院方

治遠年近日沉積及內傷冷物心腹疼

痛

烏梅

八枚不去核

巴豆

十六枚不去皮

胡椒

四十粒

青皮

半兩

陳皮

半兩二味俱不去白

右為細末醋麵糊和丸如菜豆大每服五七丸食後
生薑水下若不化更加華澄茄半兩丁香二錢半

服之更快

巴豆丸 出聖方 治心胸積聚時有疼痛

巴豆

二十枚去皮研
紙包壓去油

桔梗

一兩去
蘆頭

杏仁

二十
枚湯

浸去皮火雙

藜蘆

一兩去蘆
頭灸黃

皂莢

二兩去皮
塗酥灸令

仁麩炒微黃

黃焦

去子

右件先搗藥桔梗皂莢藜蘆等羅為末後細研巴豆

杏仁如膏煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大每日
虛心溫水下三丸如未覺即加至五丸

萬靈丸

治積聚滯氣胸膈痞悶心腹刺痛

雄黃

研

大黃

剉炒

陳橘皮

去白焙

白牽牛末

肉蓯蓉

酒浸切焙

青橘皮

湯浸去白焙

杏仁

去皮尖雙仁炒

乾漆

炒烟出

巴豆

去皮心膜出油各半兩

訶黎勒

炮去核三分

木香

藿香葉

天南星

炮各一分

胡椒

半分

右為末用薄荷汁煮麵丸如菴豆大傷飲食生薑

下三九至五九傷酒嚼燒生薑下十九婦人血氣

心痛酒煎當歸調沒藥末一錢匕下十九

百當膏

出聖濟
總錄

治一切積聚心腹疼痛年月深久者皆

治一歲至百歲并可服

丹砂

膩粉

研各半兩

水銀

鉛

各一分二
味炒紫

牛黃

研

龍腦

研

粉霜

研

陽起

研各一分

黃蠟

半兩

巴豆

肥者一百二十枚去皮
心膜研出油取霜用

蜎梢

炒一分

半夏

一錢湯洗七遍
二味杵羅為末

右合研極細勻鎔蠟并熟蜜少許同和成膏旋丸如
梧桐子大每服三丸至五丸量大小虛實加減服
吐逆藿香湯下取熱積生薑蜜水下取冷積乳香
湯下風涎薄荷湯下便利米飲下

沉香丸

治五積氣結面色萎黃心腹疼痛口吐酸

水有時發嗽積年不已

沉香

兩半

丁香

兩半

木香

兩半

硃砂

一分

巴豆

霜

兩半

蓬莪茂

煨

桂

去粗皮

乾漆

炒出烟

乾薑

炮

青橘皮

去白焙

荆三稜

煨

白芷

去皮各一兩

大黃

一兩生為末用醋一升慢火熬成膏

右搗研十二味為末入大黃膏和丸如梧桐子大每

服五丸食後臨卧生薑湯下

乙丑丸

出聖濟總錄

治食積隱伏見時作攻心脇疔刺疼痛

硃砂

細研湯內飛過去砂石熱取霜

烏頭

生去皮臍為末各一兩

沉香

末

五靈脂末

去粗皮

胡椒末

乾薑末

巴豆

去皮心膜各半兩研

乾漆末

三分

右除巴豆外同研勻次入巴豆再研極細同熟棗肉
和作一塊用濕紙裹三五重用紙筋黃泥固濟約
厚半指許燻乾用熟炭火十觔於乙丑日早漸進
火燒令香為度以新盆器合候冷取出及焦紙灰
不用搗爛看鞭輭再入熟棗肉和約千餘杵得所
丸如梧桐子大每服三丸溫木瓜酒下木瓜湯下
亦得不拘時候服如大瘕癖積塊及諸冷氣疝刺
疼痛或泄痢膿血食前服五丸至七丸看虛實加

減

狼毒丸

出聖惠方

治積聚氣結成塊段在腹下久不消散發

欬疼痛

狼毒

細剉醋拌炒令乾

芫花

醋拌炒令乾

乾漆

搗碎炒令烟出

雄雀糞

微炒

五靈脂

鼈甲

塗醋炙令黃去裙襴

硫黃

細研

入

硃砂

不夾石者細研以上各一兩

膩粉

半兩研入

右件藥搗為末入研藥令勻以醋煮麵糊和丸如梧

桐子大每服空心以醋湯下三丸至五丸當利下

惡物

吳茱萸散

出聖惠方

治積聚氣心腹脹滿飲食減少四肢不

和

吳茱萸

一兩湯浸七遍焙乾微炒

白朮

一兩

當歸

一兩剉碎微炒

枳實

半兩麩炒微黃

紫苑

一兩湯浸去皮微炒

桂心

一兩

檳榔

一兩 鼈甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

郁李仁

一兩湯浸去皮微炒

右為粗散每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分

去滓食前稍熱服

縮砂丸

出楊氏方

溫中散滯消飲食治胸膈噎悶心腹冷痛

大能煖化生冷菓食夏月不可缺

天南星

湯浸去皮七通焙乾碎

高良薑

各四兩

縮砂仁

一兩

右為細末生薑自然汁煮麵為丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯下

熨氣法

出澹齋法方

大艾

打熟砂石銚內灼滴少醋令香熱極

右以二三絹袋袋藥更替乘熱搭腹上印熨一法只

炒食鹽炒極熱按熨痛處亦效

軟犀丸

出楊氏家藏方

治久虛沉積心腹撮痛腸滑下痢臍臍

不固日漸羸瘦

沉香

檀香

各一分

丁香

木香

肉苳

麝

麝香

檳榔

已上四味各半兩六味同為細末

巴豆

二十一粒去殼

杏仁

二十一枚去皮尖炙

白丁香

一字

鷹糞白

一字

百

草霜

一字

右件除前沉香等六味外將後巴豆等五味用鉄銚

子內慢火炒至烟出無令太過不及候得所用一

磁蓋蓋放冷一宿研細與前藥末相和研勻同黃

蠟一兩半麻油一兩同煉鎔和藥成劑旋丸如菉

豆大每服十丸至三十生薑湯下食後臨卧服

異香紅丸子

出楊氏家藏方

治一切積聚心腹疼痛婦人血氣

攻注常服消滿食破積氣

沉香

硃砂

研別

使君子

去殼

蓬莪朮

炮切

荊

三棱

炮浸汁

硃砂

研別

木香

以上七味各一分

栝榔

一枚

大者

肉苳菹

一枚大者

母丁香

五粒

巴豆

二十粒好者去皮心

膜不出

黑牽牛

一兩炒熟取末半兩入藥餘者不用

澄茄

一分

油研

右件為細末麵糊為丸如菉苳大硃砂為衣每服三

丸菹香湯下欲微利加至五七丸食後服

賜方五香湯

出楊氏家藏方

治積寒攻衝腹脇疼痛

木香

沉香

滴乳香

別研

藿香葉

吳

茱萸

湯洗七次已上五味各三兩

麝香

一兩別研

右件除乳麝外為咬咀以水五升煮取二升去滓入

二香煎令濃再服分三服一方寒熱頭痛加獨活
四肢不舉無力口乾加桑寄生連翹兩脇脹痛加
射干大黃大黃看虛實加減小便不利加通草不
拘時候

治五臟癥結心腹積聚疼痛

用戎鹽水消服之

積聚宿食不消

附論

凡飲食入胃脾臟化之若腹有積聚攝養乖度飲食不

時則脾胃愈弱飲食遲化故為宿食不消之病其狀噫
食氣臭胃脹煩滿診其脉來實者是也人之有身藉五
穀以生故胃以納之脾以剋化之脾胃喜煖不宜以生
冷傷之體虛者不善調養飢飽失時或過減飲食并一
切生冷之物脾胃法弱不能剋化停蓄胃脘遂成宿滯
輕則吞酸嘔惡腦滿噎噫或泄或利其臭如抱壤雞子
或米穀不化甚則積聚結而為癥瘕之病治之須究其
源又須量人氣體虛實病證淺深投以藥餌病之淺則

消化之甚必須推利而後調補脾胃或有因挾寒熱之
氣而泄者又當以脉證辨而料理凡一切冷食不消宿
酒不散亦類傷寒身熱惡寒戰慄頭痛腰脊強不可用
雙解散導引丸木香枳榔丸共六十丸量虛實加減利
五七行所傷冷物宿食酒推盡頭痛病自愈矣次以五
苓散生薑棗煎用長流水煎取五六錢不可服酒癰丸
進食丸此藥巴豆有大毒故也凡一切沉積或有水不
能食便頭目昏眩不能清利可茶調散吐之次服七宣

丸木香栴榔丸膏粱之人起居閒逸奉養過度酒食所傷以致中脘留飲脹悶痞滿必當服木香導飲丸治之若田野蕪蕘之人食疎衣薄動作勞役若酒食所傷心腹滿悶醋心時吐酸水可用進食丸以其勝毒也病甚者每月泄三五次夫饜飪之邪從口入者宿食也蓋五味入口所以滋養五臟得之則生不得則死傷之則反為害所以宿食為雜病之先若五臟不平食不輸化血凝氣滯羣証蜂起皆宿食所為也治之宜量臟腑虛實

淺深為治養生方戒不得用巴豆令服青木香丸如有
食癖非巴豆不剋所謂擾乎可擾擾亦無擾

方

集香丸

治傷生冷硬物不消

荊三稜

廣茂

青皮

陳皮

川練

子

益智

茴香

丁香

各一兩

巴豆

皮和

米炒焦黑

色五錢

右為細末醋和為丸每服五七十丸食前生薑湯下

治一切氣宿食不消方

右用訶黎勒一枚入夜含之至明嚥咽

紫沉消積丸

出華陀方

治久積伏滯胸膈膨脹心腹刺痛不

化飲食及婦人血氣疼痛

沉香

剉

阿魏

醋化研

巴豆霜

各一兩

硃砂

研細四兩

同研勻用蜜一觔酒二蓋共熬成膏以瓷盒盛

丹砂

二兩

硫黃

研

木

香

人參

桂

去粗皮

胡椒

各四兩

丁香

乾薑

炮各二兩

右將前四味蜜酒熬成膏餘並搗羅為末用膏和搗
千百杵丸如菉豆大每服五七丸溫橘皮湯下如
心痛溫酒下婦人血氣痛當歸湯下一方有沒藥

一兩

鼈甲散

出聖濟
總錄

治肋下結塊連心腹痛食冷物即劇

鼈甲

去裙襴
醋炙

疾藜子

炒去角
各二兩

黃芩

去黑
半兩

桂

去粗皮

柴胡

去苗

桔梗

炒

當歸

切焙

牛膝

醋浸

切焙

赤茯苓

去黑皮

芍藥

大黃

剉醋拌炒

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

訶梨勒

煨去核各二兩

檳榔

剉二分

右搗羅為散每服二錢煮棗湯調下

葛花解酲湯

出德生堂

治宿食酒傷胸膈滿悶口吐酸水惡

食嘔逆及年遠日久酒疸面眼俱黃不思飲食

葛花

白芷薤

砂仁

木香

錢五

乾葛

二錢

陳皮

白朮

薑屑

二錢

青皮

白

茯苓

猪苓

一錢五分

澤瀉

二錢

人參

一錢五分

神

麴

五錢

甘草

三錢

右為細末每服二錢臨卧沸湯調服汗出立效不損元氣而散酒積毒如瀉者加豆豉煨二錢

荆三稜散

治積聚氣脾胃虛弱不能化穀至宿食

不消腹脇痛

荆三稜

一兩煨剉

桂心

三分

丁香

半分

益智

三分去皮

木香

五錢

大腹皮

一兩剉

前胡

一兩去蘆

白朮

二分

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁灸令香熟

乾薑

半兩炮裂剉

蓬莪朮

郁李仁

二錢一分 一兩浸湯去皮微炒

青橘皮

一兩湯浸去白瓤焙

赤

茯苓

一兩

川大黃

一兩剉碎微炒

右為粗散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎

至六分去滓每於食前稍熱服

藿香煮散

治久積聚宿滯不消或翻胃吐逆惡心

乾嘔及脾寒等疾

藿香葉

木香

陳橘皮

湯浸去白焙

肉豆蔻

去殼煨

人參

訶黎勒皮

去黑皮

白茯苓

去黑皮

甘草

炙

草豆蔻

去皮

麥蘖

炒

陳皮

炒各一兩

乾薑

炒半兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩半

高良薑

剉炒五錢

右搗羅為散每服二錢水一盞生薑一塊打碎同煎

至七分入鹽一捻熱服水瀉及腸風毒熱陳米飲

調下

神效感應方

治消宿食除積滯常服不動臟腑

黑沉角

磨

木香

檀香

全丁香

陳

皮

青皮

黃連

砂仁

香附子

去黑

毛見白

巴豆

三百粒肥白淨研為細末

半夏

水浸去面衣

三稜

煨

蓬朮

大者煨
各一兩

肥烏梅肉

重一
百文

右用薤器一隻盛巴豆上以烏梅肉蓋之却用陳米
醋浸過與烏梅肉平於甑上蒸至極熟以巴豆紅
色為度却濾出研令極爛次用糯米粽和前件諸
藥搜勻搗千百杵以黑色為度衆手丸如蘿蔔子
大每服一十九宿食不消陳皮湯下氣滯茴香湯
下酒後嘔吐薑湯下

法製生薑散

治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心

不欲飲食

生薑

十兩用青棒搗過再白麴拌泥焙乾用之

桂

去粗皮

青皮

去白

陳皮

去瓢

半夏

生薑製

白朮

各一兩

丁香

木

香

去白

華澄茄

各二兩半

白芷

縮砂仁

白茯苓

各一兩半

甘草

炙

葛根

各半兩

右為細末每服三錢溫酒調下不拘時候

仙方內消丸

治酒食過傷脾胃

青皮

陳皮

去白

蒼朮

米泔浸

桂

去皮

三稜

煨

蓬朮煨

乾漆炒去烟

芫花醋煮

草霜

附

子

故紙炒

皂角各三兩

黑牽牛半兩半生半熟

右為末醋和丸梧桐子大三十九隨湯下一方加半

夏三兩

訶黎勒散

出聖惠方

治積聚宿食不消四肢羸瘦乏力

訶黎勒

一兩煨用皮

附子

一兩炮去皮臍

草豆蔻

一兩去皮

白朮

三分

當歸

半兩剉碎微炒

人參

半兩去蘆頭

神麴

一兩

火煨

黃耆

三分剉

桂心

一兩

陳橘皮

一兩湯浸去白瓤焙

檳榔

一兩

郁李仁

一兩湯浸
去皮微炒

赤茯苓

一兩

右為粗散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不拘時候稍熱服

乳香丸

出聖惠方

治宿食不化心膈氣滯中焦不和及癥癖

積聚或多嘔逆並宜服

乳香

半兩別研入

木香

半兩

肉豆蔻

半兩去殼

當歸

半兩

剉微炒

青橘

半兩湯浸
去白瓢焙

荊三稜

半兩煨剉

乾漆

半兩

搗碎炒
令烟出

紫壳

一兩去
苗土

乾薑

一兩炮
裂剉

附子

一兩

地裂去
皮臍

鼈甲

一兩半塗醋炙
去黃去祖襴

硃砂

一兩
細研

巴

豆

一兩去皮心研
紙裹壓出油

右藥除乳香硃砂巴豆外餘藥並搗羅為末入研子

藥都研令勻每兩匙藥末用細蕎麵一匙相和更

研令勻洒水為丸如菰豆候乾以漿水煎令沸下

藥丸子煮一兩沸候藥丸子浮上乃瀉出收竹篩

子內晒乾每服以溫湯下三丸或五丸若有久積

聚常於卧時服五丸瘥

木香丸

出聖
虛方

治積聚氣脾胃虛冷宿食不消心腹氣滯

脹滿疼痛

木香

三分
剉

白朮

三分
去蘆

人參

三分
去蘆

赤茯苓

三分

橘皮

一兩
去白

吳茱萸

半兩湯浸七
通焙乾微炒

乾薑

半兩炮
裂剉

桂心

三分

訶黎勒

一兩煨
用皮

檳榔

一兩

神麴

一兩
炒微

黃

大麥蘗

一兩炒
微黃

川大黃

一兩剉
碎微炒

當歸

半兩

剉微
炒

桔梗

半兩去
蘆頭

右為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於

食前以溫酒下三十丸

黑神丸

出聖濟總錄

治消積化氣進食

木香

硝砂

研

蓬莪茂

煨剉

荆三稜

煨剉各半兩

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮

乾漆

搗碎炒出

烟

大黃

煨為末

青橘皮

湯浸去白焙

墨

燒過

巴豆

去心皮膜細研出油各一兩

右以好醋一大碗先熬硝砂令沸又熬巴豆數沸又加大黃末熬成膏餘藥並搗羅為末以膏杵和丸

如菜腹子大每服二丸五丸茶酒任下如消食化

氣生薑橘皮湯下小腸疝氣茴香酒下婦人血氣

當歸酒下

硃砂煎丸

聖濟總錄

治一切積聚停滯化氣消食補益真氣

產後逐敗血補虛損

硃砂

棟通明無石者別研如粉

當歸

酒浸一宿去蘆頭切焙

肉苁蓉

酒浸一宿薄切作片焙乾

巴戟天

酒浸一宿去心焙

檳榔

生各一兩

棟實

洗過切破四兩酒浸一宿候軟以刀子刮割下瓢去皮核下用三兩

藁香子

微炒

木香

沉香

附子

炮裂去
皮臍

天雄

用酒

煮五七百沸候軟
刮下皮臍各一兩

阿魏

半兩米醋磨
成膏入清茶

右為細末以無灰酒煮麴和丸如梧桐子大每服三

十九空心日午溫酒下常有婦人病蓐中下痢日

久甚困篤百方不瘥醫曰蓐中痢與他痢不同常

痢可用苦瀝藥止今蓐中利生於血不足投瀝藥

則血愈不行痢當愈甚產後痢者宜投硃砂丸日

三服痢頓減半次日遂愈此藥產後雖無病亦宜

服之能養血去積滯

應驗方

治大人小兒百物所傷難經云脾氣通於

口口和則知穀味矣心氣通于舌舌和則知五味矣
知穀味五味莫不由口舌而入胃也善攝生者謹於
和調使飲食一入於胃隨消隨化則無滯留之患若
稟受怯弱飢飽失時或過食五味魚腥乳酪強食生
冷菜菜停蓄胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔噦胸膈噫
噎痞悶不食久則積聚結為癥瘕面黃羸瘦此皆宿

滯不消而生焉大率纔有停滯當量人虛實速宜剋化之不可後時養成沉疴也

青皮

陳皮

三稜

蓬莪

丁香

木香

檀香

沉香

麝香

各一錢

腦

子

半錢

黃連

三錢

巴豆

一百粒

去皮心膜陳米酒醋半盞煮熟冷研極爛細

右為細末入巴豆合同麝香腦子十分和勻用糯米

粽子取火搜和勻成膏棒捶二十餘下丸如米大

大人服三十九小兒斟酌服之用陳皮湯任下臨

卧服

通神丸

治積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不

足

蜀椒

去目并閉口炒出汗

附子

炮裂去皮臍

厚朴

去粗皮生薑汁炙

半夏

湯浸七遍焙各一兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒研

麝香

上

炒各三兩

芒硝

研五兩

大黃

剉炒九兩

右除研外搗羅為末與杏仁芒硝研勻鍊蜜丸如梧

桐子大每服二十九米飲下忌猪羊肉飴冷水

小分氣丸

治久積氣塊宿食不消胸膈痞悶痰逆

惡心不思飲食臍腹刺痛醋心噎塞

木香

兩一

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去白焙

棟實

剉炒

乾薑

炮

青橘皮

湯浸去白各半兩

蓬莪茂

醋浸一宿煨過一兩

巴豆

去皮心膜出油淨

半夏

湯浸一遍去滑焙

大黃

煨剉各一

分

雄黃

研一兩

右為末醋煮麴和丸如菉豆大每服五丸七丸溫生薑湯下食後臨卧服

桂香勻氣湯

治消積滯化宿食痰飲胸膈痞悶

桂

皮去粗

丁香皮

縮砂仁

益智

去皮炒

檳榔

剉

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

木香

蓬莪茂

煨各一兩

烏梅

和核一兩半

青橘皮

湯浸去白焙一兩

巴豆

去皮心膜研出油六十四粒

右除巴豆外搗羅為末和勻煮麵和丸如麻子大每

服七丸至十丸茶酒任下食後服

乳香丸

出聖濟總錄

丁香

木香

各一兩

附子

炮裂去皮臍

五靈脂

乾薑

炮各半兩

桂

去粗皮

芫花

醋拌炒黃

青橘皮

湯浸去白

焙各三分

猪牙皂莢

去皮酥炙一兩

巴豆

去皮心膜別研如膏新瓦上攤

去油取霜一錢

乳香

一兩

右除乳香五靈脂末巴豆以外八味搗羅為末入上

三味拌勻煮陳麪和丸如菉豆大每服二丸三丸

生薑湯下量虛實加減食後臨卧服

阿魏丸

出瘰生方

治脾胃怯弱食麪或食生菓停滯中焦不

能尅化致腹脹痛嘔惡不食或痢或秘悉主之

阿魏

酒浸化旋入

官桂

不見火

蓬朮

煨炮

麥蘖

炒

神麴

炒

青皮

去蘖

蘿蔔子

炒

白朮

薑乾

炮各
半兩

百草霜

錢三

巴豆

去殼油三十粒

右為細末和勻用薄糊為丸如菉豆大每服三十丸

不拘時薑湯下麴傷用麴湯下生薑傷用麴香湯

送下

如意丸

治消積化氣溫胃食後心膈妨悶

威靈仙

去苗土

附子

生去皮臍二味各半兩同為末用好醋半盞浸一宿

硫砂

細研一分

巴豆

十一粒去皮心膜出油二味同研用酒半飮醋半飮同煎與前

二味同熬成膏

木香

半兩

蓬莪茂

煨剉半兩

大黃

剉炒三分

青橘皮

湯浸去白炒一兩

神曲

炒半兩

丁香

一分

右將後六味為末以前四味膏和更別熬醋少許研

墨汁同丸如棗豆大每服五丸七丸薑湯送下

麝香丸

出聖惠方

治氣消食心腹氣痛

麝香

一分細研

木香

枳殼

五靈脂

半兩湯浸去白

熟焙

巴豆

半兩去
皮心

硫黃

一兩

右以生絹袋硫黃巴豆同內湯中煮懸袋於鍋上勿
令着底可半日久去硫黃巴豆晒乾與木香四味
加入麝香同研勻用水浸蒸餅和丸如菉豆大每
服五丸以橘皮湯送下

益智散

出聖濟錄

治脾胃虛冷積聚沉結宿食不化

荆三稜

煨剉

益智

去皮炒

蓬莪茂

煨剉

白茯苓

去黑

皮各一兩

青橘皮

陳橘皮

二味並湯浸去白炒

人參

剉

甘草

炙剉各半兩

木香

一分

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

右搗為散每服一錢入鹽少許沸湯點服不拘時候

三台丸

出千金方

療五臟寒熱積聚腹脹腸鳴而噎食不作

肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不復發食後服

五丸飲多者吞十丸長服令人大小便調和長肌肉

古病源云積聚而宿食不消者由腹臟為寒氣所乘

脾胃虛冷故不能消化留為宿食也診其脉來長實

心腹積聚飲食不消胃中冷故也

大黃

二兩 蒸

熟硝

一升 升

葶藶

一升 煎

前胡

二兩

厚

朴

一兩 炙

附子

一兩 焙

茯苓

半兩

半夏

一兩 洗

杏

仁

一升 去皮尖炒

細辛

一兩

右搗篩蜜和搗五十杵酒服如梧子大五丸稍加以

知為度忌羊肉飴生菜酢物一方無厚朴

硃砂丸

出聖惠方

治一切氣及消宿食

硃砂

三分 細研

木香

一分

栝榔

半兩

阿魏

半兩

皂莢

一錢 炙

麝香

半分

肉豆蔻

一分 去殼

巴豆

二十枚 去皮心以醋

煮半日取
出研令細

右件藥為末都研令勻以糯米飯和搗三二百杵丸
如麻子大每服不計時候以生薑橘皮湯下三丸
至五丸

快活丸

黑牽牛半

剉

大麥芽

半剉用巴豆三錢
炒黃色去巴豆

香附子

四兩炒
去毛

青皮

二兩
半

蘿蔔子

四兩
炒

桨榔

二兩

蓬朮

三稜

醋炙各
四兩

大黃

二兩
生用

右為細末水和丸如梧桐子大每服七丸以淡生薑

湯下

木香丸

治積聚宿食不消中脘痞滯煩悶氣促腹

內刺痛噫氣不思飲食

木香

半分

枳榔

剉一兩

陳橘皮

湯浸去白焙半兩

荆三

稜

煨一兩

丁香

一分

乾薑

炮一分

蓬莪朮

煨半兩

巴豆

去皮心膜出油半錢

硃砂

研飛半兩

右除研外搗羅為末入巴豆硃砂合勻湯浸蒸餅丸

如菜豆大每服二丸至三丸溫生薑橘皮湯下食

後服

黑虎丸

出聖濟總錄

治諸積宿食不消

芫花

炒

甘遂

炒

烏頭

炮去皮臍

荊三稜

煨

大

戟

炒

牽牛子

炒

乾薑

炒

陳皮

去白焙各半兩

乾

漆

二兩炒出烟盡

右為末以醋煮麴和丸如菜豆大每服二丸消食化

氣溫水下取積滯米湯下溫病傷寒薑醋湯下氣

痛艾湯下本臟氣虛炒篠香子酒下瘰癧桃枝湯

下婦人血氣勞氣醋湯下寸白蚘煎牛肉湯下

巴豆丸

出聖惠方

治積聚宿食不消心腹脹滿疼痛

巴豆

半兩去皮心出油研入

附子

一兩炮裂去皮臍

桂心一兩

硫黃

一兩半細研水飛過

五靈脂

一兩

雄黃

一兩細研水飛

麝

香

一分細研

乾薑

一兩炮裂剉

香墨

半兩

右為細末入巴豆都研令勻用糯米飯和丸如小豆

大每服於食前以生薑橘皮湯下二丸

丁香丸

出聖惠方

治積聚氣宿食留滯不能消化

丁香

半兩

木香

半兩

巴豆

一分去皮心出油研入

硫黃

半兩

細研水飛

硃砂

半兩細研水飛

膩粉

一錢

麝香

一錢細研

乳

香

半兩

神麴

一兩半別搗末

右為細末都研令勻以酒煮神麴末和丸如菜豆大

每服食前生薑橘皮湯下三丸

治暴食宿食留飲不除腹中為患方

出肘後方

右用巴豆一枚去皮心熬之椒目十四枚豉十六粒

合搏為丸服二丸當吐利不盡更服二丸服四神
丸下之亦佳

順氣丸

治一切積氣宿食不消

黑牽牛

一觔取
頭末

右用蘿蔔存頂蓋剉令空內藥末不許納實蓋頂紙
封蒸熟取出藥末將蘿蔔搗碎加白豆蔻末二三
錢重用自然汁和丸如梧桐子大每服三十九丸任
意加減服之

磨積消食治痞悶膨脹

右杏仁每七粒用巴豆一粒去殼同麩炒熟去巴豆
不用每服杏仁去皮尖細嚼三五枚溫湯送下食
後臨卧服

又方

出肘
後方

右椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搏以棗膏丸如麻
子服二丸下痛止

赤子丸

出聖
惠方

化氣消食

巴豆

半兩去皮用冷水內浸一宿取出心膜於紙上收乾後將麪作餅子攤巴豆在內如作

夾子膏者麪勿令薄熟湯內煮直候黃色漉出去麪取巴豆於乳鉢內兩手研以細為度

楨

柳

肉豆蔻

去殼

木香

桂心

乾薑

炮製

剉

青橘皮

湯浸去白焙已上各半兩

硃砂

半兩細研

右件為末入巴豆細研令勻以醋煮麪糊和丸如麻

子以朱砂為衣滾過曬乾每服以橘皮湯下三丸

硃砂煎丸

出聖惠方

治一切積滯氣脅膈不利飲食難化心

腹結硬欲成癥瘕面色已萎黃臍腹多痛宜服

石砂

一兩去夫
石者研

乾漆末

一兩

荆三稜

一兩

巴豆

一兩去皮心
研紙裹槌白

已上五味用頭醋五升於磁瓦器內以慢火熬三

日成膏入後藥末

川大黃

一兩剉
碎微炒

附子

一兩炮裂
去皮臍

香墨

一兩

青

橘皮

一兩湯浸
去白瓢焙

當歸

一兩剉
微炒

右件等藥搗羅為末入前煎中相和搗一千杵丸如

菉豆大每服一丸以溫酒下

寬中丸

而逐積滯化宿食利胸膈

烏頭

炮裂去
皮臍

吳茱萸

湯浸
焙

良薑

甘遂

炒

大黃

梔子仁

各半
兩

巴豆

去皮心膜研出
油四十九粒

右為末用棗肉丸如菉豆大每服一九生薑橘皮湯

下

檳榔丸

出聖濟
總錄

取積聚消宿食

檳榔

生剉
兩枚

巴豆

去皮心膜麩
炒二十一枚

牽牛子

炒

礞

砂

研一
分

青橘皮

湯浸去白
焙半兩

大黃

濕紙
包煨

乾漆

炒烟出
各一兩

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大以丹砂為衣每服一
丸至二丸溫水下如要瀉取食積三五丸或七丸
十丸量虛實加減空心煎葱白湯下瀉後服和氣

人參湯

和氣人參湯

出聖濟
總錄

人參

白茯苓

去黑皮

厚朴

去粗皮注
水薑汁炙

肉苳

薏去殼

甘草炙

陳橘皮

去白
麩炒

懷香子

炙

木

香 白朮 桂

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚劈同

煎至七分去滓溫服

七星丸

出聖惠方

化氣消食

巴豆

一兩去皮心油煎令黃黑色去油

硃砂

半兩細研

檳榔

半兩

木香

半兩

丁香

半兩

乳香

半兩

肉苳蔻

半兩去殼

右為末入硃砂巴豆等研勻以麪糊丸如麻子大每

服以溫酒下五丸湯下亦得

木香丸

消食化氣利胸膈及積聚凝滯臍刺痛

木香

為末

丁香

為末

巴豆

去皮心膜研出油各半兩

硃砂

研半

兩

大棗

去皮核

烏梅

去核為末各三十枚

右先將水拌白麴作一薄餅以棗肉鋪餅上次以前

四味藥末和勻復鋪棗肉上作饅頭裹就用炭火

四圍炙燂候麴焦黑約藥透取出地面上出火毒

候冷打破去焦麴不用將藥與烏梅末同搗稀麴

糊丸如黃米大每服二丸至三丸食後生薑湯下

或隨所傷物湯下

黑丸子

出永類
餘方

治中脘有宿食吞酸惡心吐清水噫氣

或心腹疼痛及中虛積聚飧泄赤白痢下

烏梅肉

七個

百草霜

三錢

杏仁

去皮尖別
研三七枚

巴豆

去殼油

二枚

半夏

湯泡七
次九枚

縮砂仁

三七枚

右為細末和勻用薄糊為丸如黍米大每服十五丸

加至二十九丸用熟水送下薑湯亦得更酌虛實增

損丸類或因食生冷魚膾得腐用治中湯送下亦

可

鷄舌香散

出德生堂

治男子婦人陰陽不和臟腑虛弱中脘

氣滯宿食停積留飲不消胸脇脹滿心脾引痛攻刺

腹脇有妨飲食及治中酒吐酒停飲侵積嘔逆惡心

噫氣吞酸

良薑

官桂

香附

芍藥

各一兩

甘草

二兩半

烏藥

一兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服不拘時此

藥治心氣疼大妙

巴豆丸

出聖惠方

治冷氣破積聚消宿食

巴豆

一兩以漿水煮一日不住添熱水去皮心膜紙壓出油

桂心

一兩

硫

黃

一兩細研水飛過

木香

一兩

栴榔

半兩

附子

半兩炮裂去皮

臍

右件為末入巴豆硫黃同研令勻用軟飯和丸如棗

豆大每服以生薑湯下五丸

木香丸

治積聚宿食不化留滯成塊心腹疼痛脾

倦多困日漸黃瘦

木香

三分

蓬莖

荆三稜

二味煨劉
各一兩

丹砂

三研

分

巴豆

去皮心膜研
出油二十粒

右將前三味搗羅為末入巴豆丹硃醋煮麴糊丸如

菴豆大每服三丸至五丸生薑橘皮湯下食後臨

卧服

治積聚宿食不消虛羸腹脹

出聖
惠方

吳茱萸

二兩湯浸七
遍焙乾微炒

巴豆

半兩去皮心研如
膏紙包壓出油

右件藥先搗羅萊莢為末以醎醋一大碗浸萊莢末
一宿至來日於銀鍋內熬候萊莢似膏即以巴豆
膏更熬候可丸即丸如萊豆大空心以溫酒下三
丸如氣散惡物下即住服

小丁香丸

出聖濟方

消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍

亂嘔吐治心腹脹滿肋脇刺痛胸膈痞滿噎塞不通

常服順脾胃進飲食

五靈脂

十二兩

丁香

三兩

木香

一兩半

肉豆蔻

去殼

三十枚

巴豆

去皮出油二
百一十枚

右為細末入巴豆令勻麪糊和丸如黍米大每服五
丸至七丸溫生薑湯下橘皮湯亦得食後服如霍
亂吐逆煎桃葉湯冷下小兒吐逆不定三歲服三
丸五歲以下服四丸用生薑桃葉湯下

治積聚氣宿食留滯不能消化

出聖
惠方

木香

一兩

青橘皮

一兩湯浸
去白穢焙

肉豆蔻

三分
去殼

巴

豆

半兩去皮心
出油研入

神麴

一兩
微炒

右為細末入巴豆研勻以醋煮飯丸如小豆大每服

食前以生薑湯下三丸

五福壽命丹

治一切積氣及酒醉解醒專治酒痰

寬胸利膈

枸杞子

生

白礬

枯各一兩

天麻

去苗半兩

半夏

湯泡

乾薑

生各一兩半

右為細末餗餅生剉裹藥蒸熟去蒸餅皮將藥入臼

中搗千下如乾入酒些少丸如梧桐子大每服五

七十九生薑湯下日二服

陷胃湯

出千金方

治胸中心下結積飲食不消

桔萸實

大黃

黃連

各二兩

甘草

一兩

右咬咀以水五升煮取二升五合日三服

加味青木香丸

出危氏方

治糞糕傷脾噫酸不食心腹作痛

百藥不效宜用青木香丸三十粒白丁香十粒小酒

麴二錢同為末入巴豆三粒更研和令勻蒸餅為丸

如菴豆大每服二十九漸加至三十九生薑橘皮湯

下宿滯既去其疾自安只用小酒麴木香二件為末鹽湯調服口有酒香是效

治暴宿食留飲不除腹中為患方

出射方

大黃

茯苓

芒硝

各二兩

巴豆

一兩

右搗蜜丸如梧桐子大一服二丸不痛止

木香枳朮丸

治宿滯氣消飲食開胃進食

木香

一兩

枳實

炒一兩

白朮

二兩

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸

溫水送下

治宿食不化嘔吐酸水胸膈痞悶冷氣腹痛肺寒咳嗽
並皆治之

陳皮

去皮
四兩

生薑

一兩
半洗

甘草

一兩
炙

右咬咀炒令黃赤乾研為末每服二錢鹽湯點服

化滯丸

專治飲食不消氣閉肚疼裏急後重白瀉

男女並可服之

黃丹

一兩

黃蠟

一兩

巴豆肉

三錢

右巴丹二味同細研白用碗一個香油少許慢火化
開蠟後三四次下前藥調勻滴入水不散都傾入
水中取出為度每服如蘿蔔子大水大者十五丸
生薑湯下水小者虛實隨加減用服

硃砂丸 治大人小兒百物所傷

黃丹

一兩

白麴

四兩

巴豆

五十粒去殼
去油研細

右前三味合和一處用砂鍋煮數沸去水冷定入木
香三錢硃砂二錢前後五味共搗數千下為丸如

黍米大每服薑湯下大人三十丸小兒十五丸二
歲三丸量病人虛實

感應丸

十六羅漢

杏仁生

八金剛

巴豆

四菩薩

晉東本方無分兩

依方修合休要差萬兩黃金不如他巴豆去皮棗兒
去核裝巴豆二個紙裹水煎溫燒熟杵一千餘下
用油單紙包裹旋用每服如菉豆大空心送下看
人虛實加減用

黑神丸

巴豆

血餘灰

百草霜

右各分停每服五七丸送下看人虛實與藥

白朮丸

治積聚宿食不消腹脇下妨悶血脹羸瘦

骨節酸疼多有盜汗

白朮

一兩

黃耆

一兩

牡蠣

一兩燒為粉

人參

一兩去蘆

頭

赤茯苓

一兩

川烏頭

一兩炮裂去皮臍

乾薑

半兩炮裂

剉

木香

一兩

當歸

一兩剉微炒

赤芍藥

三分

桂心

一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

防葵

半兩

鼈甲

一兩塗醋炙
令黃去裙襖

紫苑

半兩
去苗

栝榔

一兩

桔梗

半兩去
蘆頭

枳殼

一兩
熬炒

微黃
去蘆

右為細末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

於食前以溫酒下三十丸

觸痰丸

磨積滯化氣寬中

南星

水煮一滾每
個切作四塊

半夏

不切

皂角

切作
段子

生薑

皮切

明礬

槌碎各
四兩

五味一處於砂礮內用水自卯時煮至酉時以南星
內無白點為度有此不妨揀去皂角不用只將餘
藥切作薄片晒乾各焙乾為末後藥

杏仁

湯泡去
皮炙

神麴

麥芽

青皮

陳

皮

去
角

紫蘚皮

乾葛

枳殼

去
瓢

糖棗子

肉

蘿蔔子

微
炒

木香

各二
兩

右為細末入前藥末拌勻以生薑自然汁同拌隔三

四月藥成餅去皮搜碎打糊為丸如梧桐子大每

服六七十丸臨卧白湯送下

露宿丸

療心腹積聚膈上下有宿食

甘草

三分
炙

大黃

甘遂

芫花

熱

大戟

炙

葶藶子

熱各
二分

苦參

硝石

各一
兩

巴豆

半分
去

心皮熱

右用細搗合蜜和丸如小豆服三當吐下不吐下稍

益至五六丸以知為度先少起忌蒲葷藥蘆笋蒜

菜野猪肉

治積聚宿食不消虛羸腹脹

肥皂莢

半兩炙去皮
子搗為末

甘遂

三錢晒乾生
搗羅為末

牽牛

子

二錢生
搗為末

右件藥一處更研細如麴患人二十已上用藥末一

分涼水濕拌用麴桿作餛飩餅子十枚煮熟別用煖

水嚼破下之良久方取下積聚如未轉即更以前煎

水調藥末半錢投之良久取下積食初服藥後如

欲睡是藥力行量人虛實加減服之

五靈脂丸

化氣消食

五靈脂

一兩

巴豆

四十粒去皮心膜以溫紙五重裹於糠灰火內煨令熟取出細

研壓
出油

木香

半錢

右件為末研入巴豆令勻以麩糊和丸如菉豆大每服以橘皮湯下五丸

消食方

右用石燕在乳穴石洞中者冬月採之堪用餘者不中治消食如常法取二十枚投酒二升中漬之三

日後取之令飲三盞隨性多少甚益氣力

香麴散

治食過飽煩悶但欲卧而腹脹

右熬麴令微香拌服方寸匕須大麥生麴佳無麴以藥亦得凡人飲食過度生嚼蘿蔔嚥之

獨效散

療食生冷雜物或寒時衣薄當風衣食便

卧不消心腹煩滿疼痛脹急或食不化以火燒地令極熱即卧地激薄覆被取汗愈

消食丸

水楊氏家藏方

消食化積治久痢心腹膈不快腹脹不

忍飲食

烏梅

肉寧者五十枚槌碎炒令焦黃色

巴豆

五十枚生用去皮殼熬

肉

桂

去粗皮半兩

胡椒

二十粒

吳茱萸

湯泡七次一兩

右件為細末濃磨細松烟墨水浸蒸餅和劑令勻丸

如菰豆每服五七丸溫熱水送下如心腹痛醋湯

下食後服

救生丹

消酒食化氣滯空利胸膈

丁香

一分

肉桂

一分去皮

大甘草

科七分燒存性

木香

一分

巴豆

十五個去皮用油煎令黃色為度

右件六味一處杵為末以酒煮麪糊為丸如菉豆大

茶酒任下三兩丸

大黃丸

治九積滯氣餒食即不消風熱氣上衝宜

服此利氣

川大黃

四兩剉碎微炒

訶梨勒皮

四兩

人參

三兩去蘆皮

大麻子

三兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服酒下

十五丸老少以意增減服之以溘利為度

青空湯

出江楊氏

傷酒食飽滿

青橘皮

一兩

右湯浸去蘊入鹽四銖炒為末熟湯下二錢

類攻散

出集驗方

凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即瘥張
文仲備急同陸光祿說有人食桃不消化作病特
無桃林間得槁桃子燒服之登時吐病即瘥

麝香三稜丸

出楊氏家藏方

化生冷宿食散心腹脹悶止嘔吐

惡心勻氣寬膈消痰美食

荊三稜

煨切兩

人參

去蘆頭一兩

白朮

一兩

丁香

一兩

陳橘皮

去白

半夏

湯洗七次各二兩

神麴

炒黃

沉香

二味半兩

麝香

半錢別研

右件除麝香外並為細末次入麝香研令勻煮麴糊

為丸如菉豆大每服三十丸溫生薑湯下食後服

青鹽丸

出衛生寶鑑

治一切冷積作痛無時宿食不消及治

一切酒食所傷

巴豆

三十個去皮
心膜出油

硝砂

一兩

鹽豉

六十粒

揀棗

三十個

青鹽

一錢

大椒

三十粒

細麴

三錢

右為細末入巴豆研令勻醋煮麴糊為丸如梧桐子

大每服三十丸溫薑湯下空心食前服積在上食

後服之

破積導飲丸

出衛生
寶鑑

治內有積塊堅硬飲食不消化心

下痞悶

廣木香

檳榔

陳皮去白

枳殼炒

枳實

炒

廣茂炮

荊三稜炮

半夏湯洗七次

神麴炒

麥蘗炒

茯苓去皮

乾生薑

澤瀉

灸

甘草

已上各半兩

牽牛頭末六枚

巴豆三十粒去心皮膜

右為細末入巴豆霜令勻生薑麴和為丸如梧桐子

大每服三十九溫生薑湯送下食前服

治宿病

出本草

以石灰酒飲下唐李伯藥勸杜伏威朝京師既至歷

陽中悔欲殺之飲以石灰酒因大利頓欲死既而
宿病皆愈

祛宿疾

出本
準

以蒙頂茶煎服茶譜云蒙山有五頂有茶園其中頂
名上清峰者昔僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙
中頂茶當以春分之先後多搗人力同雷之發聲
併手揉摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即
能祛宿疾二兩當現前無疾三兩因以換骨四兩

即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而病瘥

治食飲不消

出本草

以蓬莪茂酒研服之

治宿食腹脹

出本草

用碧海水飲一合吐下

消宿食下氣治噉

出本草

用菰菜根冬月作蘆煮作羹食之

治宿食不消常吐酸臭水

出本草

以釣樟材酒煮服之

消食和中

以萊服嫩葉生食之大葉熟啜之

調中消食及大醉并食苽菜過度

以生熟湯浸身湯皆為酒及苽菜味

能消諸食令人易飢

以海月生椒醬調和食之良

普濟方卷一百七十二